



40. 死亡者男女及死因別 大正九年 續

Table with columns for Cause of Death (e.g., 胃ノ疾患, 下痢及腸炎, 腎臟炎及アライト氏病, 畸形及先天性弱質, 老衰, 自殺) and rows for Prefecture (e.g., 北海道, 東北區, 關東區, 北陸區, 東山區, 東海區, 近畿區, 中國區, 四國區, 九州區, 沖繩縣, 總計).

40. 死亡者男女及死因別 大正八年

Table with columns for Cause of Death (e.g., 腸室扶斯, 麻疹, 百日咳, 實布埤利亞及格魯布, 流行性感胃, 赤痢, 肺結核) and rows for Prefecture (e.g., 北海道, 東北區, 關東區, 北陸區, 東山區, 東海區, 近畿區, 中國區, 四國區, 九州區, 沖繩縣, 總計).

40. 死亡者男女

Table with 13 columns: 地方 (Location), 癌 (Cancer), 脚氣 (Beriberi), 腦膜炎 (Meningitis), 腦出血及腦軟化 (Brain hemorrhage and softening), 心臟ノ器質的疾患 (Cardiac diseases), 急性氣管支炎 (Acute bronchitis). Rows include 北海道, 東北區, 關東區, 北陸區, 東山區, 東海區, 近畿, 中國區, 四國區, 九州區, 沖繩, and 總計.

及死因別大正八年續

Table with 21 columns: 慢性氣管支炎 (Chronic bronchitis), 肺炎 (Pneumonia), 胃ノ疾患 (Gastric diseases), 下痢及腸炎 (Diarrhea and enteritis), 腎臟炎及ブライト氏病 (Nephritis and Bright's disease), 畸形及先天性弱質 (Malformations and congenital weakness), 老衰 (Senescence), 自殺 (Suicide), 番號 (Serial number). Rows include 慢性氣管支炎, 肺炎, 胃ノ疾患, 下痢及腸炎, 腎臟炎及ブライト氏病, 畸形及先天性弱質, 老衰, 自殺, and 番號.