

40. 死亡者死因年齡別 (全國) 大正十年

Table with 15 columns: 年, 腸空扶斯, 麻疹, 百日咳, 實及布格魯利亞, 流行性感胃, 赤痢, 肺結核, 其核他疾患, 癌, 脚氣, 腦膜炎, 腦軟化血及腦, 心的疾患, 急性氣管支. Rows include age groups (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90以上) and a total row.

Table with 15 columns: 年, 慢性氣管支, 肺炎及支氣管, 胃ノ疾患, 下痢及腸炎, 腎ヲ臟イト及氏病, 婦ノ疾患, 產褥熱, 爾及他產疾, 畸形弱質及先天, 老衰, 自殺, 爾ニ他依ル外死因, 其患ノ他ノ疾, 合計. Rows include age groups (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90以上) and a total row.

41. 死亡者男女及死因別 大正十年

Table with 17 columns: 地方, 腸空扶斯, 麻疹, 百日咳, 實布垚利亞及格魯布, 流行性感胃, 赤痢, 肺結核. Rows list various regions (北海道, 東北區, 關東區, 北陸區, 東山區, 東海區, 近畿區, 中國區, 四國區, 九州區, 沖繩縣) and a total row, with sub-columns for male and female counts.