

第二九表 現在人死亡者年齡別 (* 不詳男女) 明治四十一年

Table with columns for age (年 齡), sex (男, 女), total (合計), and death statistics (總死亡千中各年齡死亡, 女百二付男). Rows range from 0-1 to 37-38.

第二九表 現在人死亡者年齡別 續

Continuation of Table 29, showing age groups from 75-76 to 94-95, including total deaths and percentages.

第三〇表 現在人死亡者年齡五歲階級別(五歲以下一年別)累年比較 (* 不詳男女)

Table 30: Comparison of cumulative deaths by 5-year age groups from Meiji 30 to 40. Columns include age (年 齡), sex (男女), and years from Meiji 30 to 40.

第三〇表 現在人死亡者年齡五歲

Table with 11 columns: 年, 齡, 明治三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同四十, 同四十. Rows represent age groups from 20-25 to 70-75.

階級別(五歲以下一年別)累年比較 續

Table with 11 columns: 年, 齡, 明治三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同三十, 同四十, 同四十. Rows represent age groups from 75-80 to 110以上, plus a total row.

第三一表 現在

Table with 13 columns: 年, 齡, 腸窒扶斯, 發疹窒扶斯, 麻刺利亞, 痘瘡, 麻疹, 猩紅熱, 百日咳, 實布埤利亞, 及格魯布, 流行性感胃, 虎列刺, 赤痢, 百斯篤, 肺結核. Rows represent age groups from 0-1 to 70以上, plus a total row.

人死亡者死因年齡別 明治四十一年

Table with 16 columns: 結核性腦膜炎, 腸結核, 爾他臟器, 癩病, 梅毒, 爾病及傳染性, 獸疫傳染性, 痛腫, 爾他惡性, 新生物, 腳氣, 營養變調, 疾病, 二口蟲病, 腦膜炎, 腦出血, 腦充血, 爾他神經, 系疾患, 抽(二ル)及(七セ)子(産)産(サ). Rows represent various causes of death with corresponding counts.