

年次	虎列刺	腸窒扶斯	赤痢	實布埜里亞	發疹室扶斯	痘	瘡	猩紅熱	合計
明治二十八年	五五、一四四	四〇、一五三	八四、〇一	五二、七一	二二、九五九	六、一〇〇	三、〇二五	一、八六	一五二、四四三
同二十七年	五四、六	三一、四三六	八〇、五四	一五、五	四〇、三八	五、三〇八	二、九〇三	一、三九	二〇二、一八
同二十六年	六三、三	三六、四三〇	八、一八三	一六、七三〇	五、四一、二八二	五、七二六	三、二〇五	二、二八	二四九、八五九
同二十五年	八七、四	四九、七三三	八五、二九	七〇、八四二	二六、八四四	四、三五九	二、五三二	二、八一	一四、五、七七

本表ハ在監人ノ患者死亡ヲ含有ス又右傳染病患者死亡四季別並ニ各病患者百ニ付死亡ノ比例ヲ掲グレバ左ノ如シ

季別	虎列刺		腸窒扶斯		赤痢		實布埜里亞		發疹室扶斯		痘		瘡		猩紅熱		合計	
	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡
第一季	三十九	八	七	四、三九六	二〇六	七二	三、五九六	一、三三三	一五	六三三、三四一	九、七六九	一八六	四、一五六二	二二、二九二	—	—	九、一五六二	二二、二九二
第二季	二十九	三九	二六	六、一五五	一七二	五九	二、一〇六	九六四	二二	七〇九	一八六	二、六四四	九、二〇三	—	—	六、八七三	二、六四四	一、一八
第三季	二十八	三一	二二	四、八二二	二五一	一一	一、五四一	九二五	一七	四	七五二	一七一	二、八四二	—	—	六、八七三	二、八四二	—
第四季	二十七	二二	二	三、五六六	一〇六	二八〇	一、三三三	八八八	一一	三、七六四	二、〇〇八	—	二、九三二	—	—	二、九三二	—	—
合計	一四七、五〇	八二、九一	四七、三六	二二、五	一、〇	一、一八	一、〇七〇	六、〇、六二五	一〇、七〇七	一、五〇、四二	四、一、二六四	二、〇、三九四	一、五〇、四二	八、九、一	—	—	一、〇、八八	九、〇、一七

年次	虎列刺		腸窒扶斯		赤痢		實布埜里亞		發疹室扶斯		痘		瘡		猩紅熱		合計	
	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡
明治二十年	五四、五九	六、一一	二一、六九	二、六〇三	二五、四六	三、六〇三	三、八二七	三、九六六	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同二十九年	五七、五〇	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同二十八年	五七、五一	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同二十七年	五七、五一	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同二十六年	五七、五一	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同二十五年	五七、五一	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	五七、五一	七、二二	二二、六九	二、四〇二	二四、五八	三、二二七	三、〇四三	二九、二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第四二五 種痘人員

明治二十九年

地	方	種痘人員		種痘時	合計	初種	再種	臨種	痘時	合計	初種	同二十	同二十	同二十	同二十	同二十	
		滿一年迄	滿一年以上														
東京	神奈川	一四、七五〇	一、六八五	一、八二九	一、八二九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		二、三八八	一、八二九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

衛生 種痘人員

