

地方	九鹿兒島		區計		總計	明治二十年		同十九年	同十八年	同十七年	同十六年 (後半)
	男	女	男	女		男	女				
傳染病	544	563	351	313	664	298	251	437	378	331	233
發育及營養的病	837	902	744	809	1553	613	664	700	690	678	650
皮膚及筋病	110	73	109	96	205	67	71	51	58	54	53
骨及關節病	17	13	17	13	30	12	11	8	9	8	7
血行病	208	191	186	163	349	122	115	93	107	101	77
神經系及五官病	268	245	244	211	455	168	155	124	141	136	99
呼吸器病	1839	1807	1801	1799	3600	1468	1404	1103	1154	1104	791
消化器病	2072	2018	1995	1975	3970	1537	1464	1088	1133	1088	755
泌尿及生殖器病	160	160	157	157	314	117	117	89	99	99	77
外傷性死	136	80	126	68	194	61	55	41	47	44	33
中毒症	3	3	3	3	6	2	2	2	2	2	2
原因不詳	35	49	32	27	81	28	36	24	27	25	18
合計	8629	8336	8336	8044	16380	6385	6044	4386	4587	4386	2971
呼吸器病 ノ内肺病	715	715	715	715	1430	568	544	404	421	404	284

明治十九年ノ原因不詳並ニ十八十七ノ兩年ハ各病共十七年ノ呼吸器病ヲ除ク男女ノ區別ナキ
 モノヲ計ノミニ算入スルヲ以テ内譯ト符合セズ又十八年ハ岩手鹿兒島十七年ハ愛媛鹿
 兒島縣ノ調ヲ闕ク
 以上ノ説明ハ次ノ年齢別表モ亦同シ
 明治十六年六月病症別ノ改定アリシヲ以テ其以前ニ係ルモノハ之ヲ略ス

第三八 死亡人病症及年齡別 明治二十一年

年	齡		傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病 ノ内肺病
	男	女														
一	1659	1505	1176	1384	146	96	194	241	399	449	111	47	1	1	1151	151
二	1767	1504	1397	1344	104	57	216	255	388	497	144	30	2	2	1314	161
三	2710	1711	2111	1791	161	100	461	569	867	1011	274	44	7	3	2111	284
四	2764	1644	2164	1711	344	293	546	637	920	1033	366	58	10	4	2164	357
五	2408	1657	1808	1511	376	341	616	727	1033	1144	459	64	9	5	2408	390
六	1433	1177	1177	1000	168	136	434	530	737	834	277	44	7	7	1433	215
合計	6888	5805	6888	5805	2735	228	1263	1544	2244	2735	1695	277	31	31	6888	1049

年	至七十八十一年	以八十一年上	不詳	總計		傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋骨及關節病	血行器病	神經病及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外變性死	中毒原因不詳	合計	呼吸器病	
				男	女													
年	男	女	男	女	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
總計	二五、五六六	二〇、五四九	四、一〇七	六〇、五五九	六六、六七四	六二、〇三二	三、四九三	二、九一九	三、四九三	二、九一九	九、〇七二	六、八四六	七、〇〇九	一、〇一一	六、二二八	二、一七六	二、一七六	
男	二五、五六六	二〇、五四九	四、一〇七	六〇、五五九	六六、六七四	六二、〇三二	三、四九三	二、九一九	三、四九三	二、九一九	九、〇七二	六、八四六	七、〇〇九	一、〇一一	六、二二八	二、一七六	二、一七六	
女	二〇、五四九	二〇、五四九	四、一〇七	六〇、五五九	六六、六七四	六二、〇三二	三、四九三	二、九一九	三、四九三	二、九一九	九、〇七二	六、八四六	七、〇〇九	一、〇一一	六、二二八	二、一七六	二、一七六	

本表年齢ノ區別ハ生年ニ就キ調査セシモノナリ故ニ一年トハ明治二十一年生レノ者ニシテ二年トハ同二十年生レノ者ナリ以下之ニ準ズ又二十年以前ノ死亡人年齢別ヲ掲クシテ左ノ如シ但二十及十九ノ兩年ハ本表ト均シク生年ノ調ニシテ十八年以前ハ一年未滿一年以上等ニ區別スト雖氏今假ニ一年未滿ノ者ハ一年ノ項ニ一年以上ノ者ハ二年ノ項ニ掲載ス

年	明治二十年	同十九年	同十八年	同十七年	同十六年	同十五年	同十四年	同十三年	同十二年	同十一年	總計		上ノ内肺病		下ノ内肺病	
											男	女	男	女	男	女
合計	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四
男	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四
女	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四

年	至六十年	至五十年	至四十年	至三十年	至二十六年	至二十一年	至十五年	至十年	至五年	不詳	總計		上ノ内肺病		下ノ内肺病	
											男	女	男	女	男	女
合計	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四
男	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四
女	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四	一、一七四

明治十九年中茨城、群馬、山梨、宮城、青森、岡山、宮崎ノ七縣ハ年齢ノ區別舊式ニ據リシヲ以テ茲ニ之ヲ省ク但岡山、宮崎ノ二縣ハ上半季ノ事實ニシテ他ハ全年ノ事實ナリ又男女ノ區別ナキモノ同年ニ一名十八年ニ一萬一千二百八十一名年齢ノ別ナキモノ十七年ニ一萬一千二百七十三名アリ是等ハ假ニ計ノミニ算入ス故ニ内譯ト符合セズ

Table showing death ratios per 1,000 population by age group and year from 1901 to 1911. Columns include age groups (e.g., 10-11 years, 12-13 years) and years. Rows list various causes of death like infectious diseases, developmental diseases, skin and bone diseases, circulatory diseases, nervous system diseases, respiratory diseases, digestive diseases, excretory and reproductive diseases, external deaths, poisoning, and unknown causes. A total row is at the bottom.

第三九

各病死亡人千中年齡別比例

明治二十一年

Table showing the ratio of deaths per 1,000 people by age group for various diseases in Meiji 21 (1908). Columns represent age groups (1 year, 2 years, 3 years, 4 years) and sex (male, female). Rows list causes of death: infectious diseases, developmental diseases, skin and bone diseases, circulatory diseases, nervous system diseases, respiratory diseases, digestive diseases, excretory and reproductive diseases, external deaths, poisoning, unknown causes, and respiratory diseases of internal organs.

Table showing the ratio of deaths per 1,000 people by age group for various diseases in Meiji 21 (1908). Columns represent age groups (60-69 years, 50-59 years, 40-49 years, 30-39 years, 20-29 years, 10-19 years, 0-9 years) and sex (male, female). Rows list causes of death: infectious diseases, developmental diseases, skin and bone diseases, circulatory diseases, nervous system diseases, respiratory diseases, digestive diseases, excretory and reproductive diseases, external deaths, poisoning, unknown causes, and respiratory diseases of internal organs.

第二四〇

人口一萬ニ付死亡人病症別比例

明治二十一年

Table showing the ratio of deaths per 1,000 people by age group for various diseases in Meiji 21 (1908). Columns represent age groups (60-69 years, 50-59 years, 40-49 years, 30-39 years, 20-29 years, 10-19 years, 0-9 years) and sex (male, female). Rows list causes of death: infectious diseases, developmental diseases, skin and bone diseases, circulatory diseases, nervous system diseases, respiratory diseases, digestive diseases, excretory and reproductive diseases, external deaths, poisoning, unknown causes, and respiratory diseases of internal organs.